

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MAGNATIL-C COMPRIMIDOS EFERVESCENTES

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICION:

- Principio Activo : Magnesio 134,86 mg, Vitamina C 500 mg
- Excipientes : Ácido cítrico, Bicarbonato de sodio, Ácido adípico, Sacarina sódica, Aspartamo, Saborizante de limón, Saborizante de naranja, Colorante amarillo FD&C N° 6, Sorbitol c.s.p.

PRESENTACION: Envases con 30 comprimidos efervescentes

INDICACIONES:

Suplemento de estados carenciales de magnesio y vitamina C.

CLASIFICACION:

Vitaminoterapia C con Magnesio.

ADVERTENCIAS:

No administrar conjuntamente con sales de calcio ni simultáneamente con tetraciclinas pues se reduce la absorción.

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

Este producto contiene Aspartamo. No administrar a personas que padecen de fenilcetonuria

PRECAUCIONES:

No tomar más de tres comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima por un período de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

Puede tener efecto laxante.

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.

Si esta embarazada o amamantando debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES MÉDICAS:

Evitar la administración conjunta con Tetraciclinas porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la absorción intestinal del magnesio.

EFECTOS SECUNDARIOS:

Ocasionalmente trastornos gástricos leves y diarreas.

CONTRAINDICACIONES:

Hipermagnesemia, insuficiencia renal grave.

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación

POSOLOGIA Y FORMA DE ADMINISTRACION:

El médico deberá indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Un comprimido 2 veces al día

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.

No repita el tratamiento sin indicación médica
No recomiende este medicamento a otra persona